



**HUPAVIR**  
TCA 50

Acid trichloracetic  
Acid glycolic  
Chiết xuất tía tô

**Mô tả:**  
Công thức của dung dịch HUPAVIR TCA 50 dựa trên sự kết hợp các thành phần đặc hiệu để sử dụng loại bỗ mun cúc, mụn cám, mụn sủi, mụn sinh dục (sùi mào gà, gai sinh dục), mụn thịt, chàm hiện qua **Hỗn hợp hoạt động với da cơ chế:**  
1. Tẩy tế bào sừng: ở lớp trên cùng tạo thành mỏ se của mụn cám, mụn com, mụn sủi. Điều này cho phép lâm膜 đến cung (Hoạt chất Acid glycolic).  
2. Lột sùi mủ: tạo thành mụn cúc hoặc mụn com, mụn sủi (Hoạt chất TCA).  
3. Đào thải virus: Chiết xuất từ nấm tỏi, trà xanh có tác dụng thẩm sâu và đào thải virus bao gồm các loại virus HPV's (*Human papiloma viruses*)

**Thành phần:** Acid trichloracetic, Acid glycolic, chiết xuất tỏi, chiết xuất trà xanh, chiết xuất vú sữa  
Mục đích sử dụng:  
Hỗ trợ làm giảm tình trạng mụn cám, mụn cúc tay chân, chai chân, mụn cám ở cổ, lưng, mụn sùi mào gà, mụn cóc sinh dục, gai sinh dục (đám đao, cổ tay, cung, hậu môn) và các vị trí vùng kín khác). Phù hợp cho các loại mụn sùi có kích thước lớn, hoặc mụn sủi lâu ngày.

**Đối tượng sử dụng:**  
Dùng cho cả nam và nữ bị mụn cám, mụn cúc, chai chân, mụn sủi trên da hoặc mụn sùi sinh dục (Sùi mào gà ở nam giới, gai sinh dục ở nữ giới) do HPV (*Human papiloma virus*) hoặc các loại virus khác gây ra.  
Sử dụng cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên dưới sự giám sát chặt chẽ của người lớn.

**Hướng dẫn sử dụng:**  
**Đối với người bị mụn cám, mụn com ở tay, chân, chai chân..**  
B1: Trước khi bôi HUPAVIR TCA 50, cần rửa sạch và sát trùng khu vực da bị bệnh bằng dung dịch nước muối sinh lý hoặc cồn 70 độ. Sau đó dùng bông lau sạch khô khu vực bị bệnh.  
B2: Dùng tăm bông lấy 1 lượng kem Vaseline màu xanh, bôi thành 1 lớp kem mỏng vào vùng da lành xung quanh chân nốt sùi (cần thận không bôi lên nốt sùi).  
B3: Thảo bôi nốt nhỏ màu trắng bên trong cõi chai. Dùng tăm bông nhúng dung dịch bôi chàm nhẹ lên vị trí da bị bệnh (bôi chàm dung dịch làm sao để bít mặt da bị bệnh phải được thâm dều dung dịch), chờ khoảng 1 phút để dung dịch được thẩm sâu. Mỗi ngày bôi 1 lần, (đối với nốt sùi to hoặc sưng đỏ nhiều) hoặc cách ngày 1 lần (đối với nốt sùi bé), tăm bông chỉ được dùng 1 lần.  
Sau 3-5 ngày bôi dung dịch, sẽ thấy xuất hiện ở vị trí bị bệnh có vết sưng đỏ sưng trắng, sau lại là dấu hiệu phản ứng của mụn đang diễn biến. Tiếp tục bôi dung dịch theo hướng dẫn trên từ 7-10 ngày hoặc nhiều ngày hơn (tùy thuộc vào mụn to hay bự). Khi thấy hiện tượng mụn hoặc chai sưng đỏ bong tróc, có thể cây nhè nhẹh và bóc mụn ra. Nếu chân mụn vẫn còn thì tiếp tục bôi dung dịch theo hướng dẫn cho tới khi chúng biến mất hoàn toàn.

**Đối với người bị sùi mào gà, gai sinh dục ở vùng hậu môn..**

**vùng sinh dục**  
B1: Trước khi bôi HUPAVIR TCA 50, cần rửa sạch và sát trùng khu vực da bị bệnh bằng dung dịch nước muối sinh lý hoặc cồn 70 độ. Sau đó dùng bông lau sạch khô khu vực bị bệnh.  
B2: Dùng tăm bông lấy 1 lượng kem Vaseline màu xanh, bôi thành 1 lớp kem mỏng vào vùng da lành xung quanh chân nốt sùi (cần thận không bôi lên nốt sùi).  
B3: Dùng tăm bông chàm phết rái it dung dịch HUPAVIR TCA 50 (hoặc nước muối bôi lên nốt sùi) vào nốt sùi (gai, gai, 1-2 lần (Nếu khi bôi có hiện tượng đau rát nhiều thì châm bôi ngày 1 lần cách ngày 1 lần). Hãy nhớ bôi chính xác vào nốt mụn, châm ra ngoài sẽ gây đau rát vùng da lành. Chờ khoảng 1 phút để dung dịch được thẩm sâu.  
Nếu nốt châm dung dịch HUPAVIR TCA 50 ra ngoài thì dùng vòi nước xịt nhẹ và rửa sạch ngay. Châm vài ngày khi thấy nốt mụn sùi trắng và khô cứng (tức là mụn đã chết thì có thể cạy nhẹ, mụn bong hé là được). Nếu muỗi chua bong hé thì lập lại quy trình châm dung dịch HUPAVIR TCA 50 từ B1 như trên cho tới khi nốt sùi hoàn toàn biến mất. Tuyệt đối không được bóc non mụn (tức là tách da chàm chẽ, sẽ làm chảy máu và làm tổn thương da thịt). Khi bôi chàm mủ thì không được sử dụng dung dịch HUPAVIR TCA 50, phải chờ đến khi vết thương lành hẳn thì mới được sử dụng trở lại.  
Sau khi châm mụn bằng dung dịch HUPAVIR TCA 50, để khô khoảng từ 10-15 phút. Nếu dùng kết hợp với kem bôi HUPAVIR, bôi lên các nốt mụn đã châm dung dịch để hiệu quả được cao hơn.  
**Lưu ý:**  
- Khi châm dung dịch phải chờ 1-2 phút để bết mêt của vị trí da bị bệnh hoàn toàn thì mới di chuyển viêc khác.  
- Kiêng rửa nước ngay sau khi bôi dung dịch, nếu phải tiếp xúc với nước thì dùng miếng dán cá nhân dán lại vị trí da bị bệnh đó hoặc sau 1 giờ bôi dung dịch thì mới được tiếp xúc với nước.  
- Không được bôi dung dịch vào vết da bị trầy xước, hoặc vùng da không bị bệnh. Nếu lỡ bôi nhầm thì dùng vòi nước máy xả và rửa sạch ngay. Nếu bị tổn thương da hay lở loét da thì phải ngừng bôi ngay và dùng nước muối 0,9% rửa sạch vết thương, bôi mỡ kháng sinh Tetracyclin 1% ngày 1-2 lần, bôi vài ngày để vết thương lành hẳn.  
- Trứng sống dung dịch rời vào da lành, da có thể bị chuyển màu da xanh do da sẽ lãnh cảm, và không để tái sản.  
- Chỉ dùng ngoài da. Thời gian châm dung dịch lo máu vàng tối đa trong 6 tuần. Nếu bệnh không tiến triển, xin vui lòng tham khảo ý kiến thầy thuốc.  
**Chống chỉ định:** Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.  
Không điều trị nốt sùi tại lỗ tiểu. Không được bôi vào mắt. Để xa tầm tay trẻ em.  
Độc ký: Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
- Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.  
**Bản thân:**  
- Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.  
**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.  
**Số hiệu sản xuất TTYT:** Công ty TNHH Tân Hà Lan  
Địa chỉ: Số 8, tờ 13, cụm III, phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại tư vấn: 0963460883  
**Sản xuất theo License tại:**  
**Công ty TNHH Dược phẩm MONAPHARM.**  
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Số CB: 230001453/PCBA-HN  
Sản xuất tại Việt Nam