

Chế phẩm chăm sóc mụn cúc, mụn sủi
HUPAVIR
TCA 80

Acid tricloacetic
Acid glycolic
Chiết xuất tía tô

Mô tả:
Công thức của dung dịch HUPAVIR TCA 80 dựa trên sự kết hợp các thành phần đặc hiệu để sử dụng loại bỏ mụn cúc, mụn com, mụn sủi, mụn sinh dục (sùi mào gà, gai sinh dục), mụn thít, chai chán hiện qua

Hỗn hợp hoạt động với da cơ chế:

- Tẩy tế bào sừng ở lớp trên cùng tạo thành mảng sẹo của mụn cúc, mụn com, mụn sủi. Điều này cho phép lâm sàng dâng (Hoạt chất Acid glycolic)
- Lột sùi mò: tạo thành mụn cúc hoặc mụn com, mụn sủi (Hoạt chất TCA)
- Đào thải virus: Chiết xuất từ nấm tía tô, trà xanh có tác dụng diệt virus và đào thải virus bao gồm các loại virus HPV's (*Human papilloma viruses*)

Thành phần: Acid tricloacetic, Acid glycolic, chiết xuất tía tô, chiết xuất trà xanh, phu liệu vừa đủ

Mục đích sử dụng:
Hỗ trợ làm giảm hình trạng mụn com, mụn cúc tay chân, chai chán, mụn cúc ở cổ, lưng, mụn sùi mào gà, mụn cóc sinh dục, gai sinh dục (đam đạc, cổ tử cung, hậu môn) và các vị trí vùng kín khác). Phù hợp cho các loại mụn sủi có kích thước lớn, hoặc mụn sùi lâu ngày

Đối tượng sử dụng:
Dùng cho cả nam và nữ bị mụn com, mụn cúc, chai chán, mụn sủi trên da hoặc mụn sùi sinh dục (Sùi mào gà ở nam giới, gai sinh dục ở nữ giới) do HPV (*Human papilloma virus*) hoặc các loại virus khác gây ra
Sử dụng được cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên dưới sự giám sát chặt chẽ của người lớn

Hướng dẫn sử dụng:

Đối với người bị mụn cúc, mụn com ở tay, chân, chai chán...

B1: Trước khi bôi HUPAVIR TCA 80, cần rửa sạch và sát trùng khu vực da bị bệnh bằng dung dịch nước muối sinh lý hoặc cồn 70 độ. Sau đó dùng bông lau sạch khu vực bị bệnh

B2: Dùng tăm bông lấy 1 lượng kem Vaseline màu xanh, bôi thành 1 lớp kem mỏng vào vùng da lành xung quanh chấn thương (cần thận không bôi lên sùi)

B3: Thảo bô nứt nhô giọt màu trắng bén trong cổ chai. Dùng tăm bông nhúng dung dịch bôi chà nhẹ lên vị trí da bị bệnh (bôi chàm dung dịch làm sao để bê mặt da bị bệnh phải được thâm dều dung dịch), chờ khoảng 1 phút để dung dịch được thẩm sâu. Mỗi ngày bôi 1 lần, (đối với nốt sùi là dùng súng hóa nhiệt hoặc cách ngày 1 lần (đối với nốt sùi bén), tăm bông chỉ được dùng 1 lần).

Sau 3-5 ngày bôi dung dịch, sẽ thấy xuất hiện ở vị trí bị bệnh có vết sùi màu vàng trắng, mụn lơ (là dấu hiệu phản ứng da chia mẩn đang dần bị đào thải). Tiếp tục bôi dung dịch đúng theo hướng dẫn trên 7-10 ngày hoặc nhiều ngày hơn (tùy thuộc vào mụn có hay không). Khi thấy hiện tượng mụn hoặc chấn thương đã bong tróc, có thể cạy nhẹ nhàng và bóc mụn ra. Nếu chấn thương vẫn còn thì tiếp tục bôi dung dịch đúng theo hướng dẫn cho tới khi chúng biến mất hoàn toàn.

Đối với người bị sùi mào gà, gai sinh dục ở vùng hậu môn, vùng sinh dục

B1: Trước khi bôi HUPAVIR TCA 80, cần rửa sạch và sát trùng khu vực da bị bệnh bằng dung dịch nước muối sinh lý hoặc cồn 70 độ. Sau đó dùng bông lau sạch khu vực bị bệnh

B2: Dùng tăm bông lấy 1 lượng kem Vaseline màu xanh, bôi thành 1 lớp kem mỏng vào vùng da lành xung quanh chấn thương (cần thận không bôi lên sùi)

B3: Dùng tăm bông chàm phốt rất ít dung dịch HUPAVIR TCA 80 (hoặc ướt đầu tăm bông rồi chàm bôi nhẹ vào nốt sùi mào gà, ngày 1-2 lần). Nếu khi bôi có hiện tượng đau rát nhiều thì chàm bôi ngày 1 lần hoặc cách ngày 1 lần). Hãy nhớ bôi chàm xác vào nốt mụn, chàm ra ngoài sẽ gây đau rát vùng da lành. Chờ khoảng 1 phút để dung dịch thẩm sâu.

Nếu như chàm bôi dung dịch HUPAVIR TCA 80 ra ngoài thì dùng với nước mày xả và rửa sạch ngay. Chàm vài ngày khi thấy nốt mụn sùi trắng và khô cứng (tức là mụn đã chết) thì có thể cạy nhẹ, mun bong hết là được). Nếu mun chưa bong hết thì lặp lại quy trình chàm dung dịch HUPAVIR TCA 80 từ B1 như trên cho tới khi nốt mun hoàn toàn biến mất. Tuyệt đối không được bóc non mun (tức là mun chưa chàm, sẽ làm chảy máu và làm tổn thương da thịt). Khi bị chảy máu thì không được sử dụng dung dịch HUPAVIR TCA 80, phải chờ đến khi vết thương lành hẳn thì mới sử dụng trở lại.

Sau khi chàm mun bằng dung dịch HUPAVIR TCA 80, để khô khoảng tối thiểu 5 phút. Nên dùng kết hợp với kem bôi HUPAVIR TCA 80, bôi lên các nốt mụn đã chàm dung dịch để hiệu quả được cao hơn.

Lưu ý:

- Khi chàm dung dịch phải chờ 1-2 phút để bê mặt của vị trí da bị bệnh khô hẳn thì mới dán việc khác
- Kiêng rửa nước ngày sau khi bôi dung dịch, nếu phải tiếp xúc với nước thi dùng miếng dán cẩn thận lại vị trí da bị bệnh đó hoặc sau 1 giờ bôi dung dịch thi mới được tiếp xúc với nước
- Không được bôi dung dịch vào vết da bị trầy xước, hoặc vùng da không bị bệnh. Nếu bôi nhầm thi dùng với nước mày xả và rửa sạch ngay. Nếu bị tổn thương da hay lở da thi phải ngừng bôi ngày và dùng nước muối 0,9% rửa sạch vết thương, bôi mỡ kháng sinh Tetracyclin 1% ngày 1-2 lần, đợi vài ngày để vết thương lành hẳn.
- Trường hợp dung dịch rò ráo da lành, da có thể bị chuyển màu đen. Sau đó sẽ lành dần, và không để lại sẹo
- Chỉ dùng ngoài da. Thời gian chàm dung dịch ở lỗ mày vắng tối đa trong 6 tuần. Nếu bệnh không khỏi thi dùng với nước mày xả và rửa sạch ngay. Nếu bị tổn thương da hay lở da thi phải ngừng bôi ngày và dùng nước muối 0,9% rửa sạch vết thương, bôi mỡ kháng sinh Tetracyclin 1% ngày 1-2 lần, đợi vài ngày để vết thương lành hẳn.

Chống chỉ định: Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm

Không điều trị nốt sùi tại lỗ精英. Không được bôi vào mắt. Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của thầy thuốc

Bảo quản:

- Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Sở hữu số lưu hành TTBYT: Công ty TNHH Tân Hà Lan
Địa chỉ: Số 8, Tổ 13, Cụm III, phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại tư vấn: 0963460883

Sản xuất/cho phép/Địa chỉ: Công ty TNHH Dược phẩm MONAPHARM
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thành Oai, Xã Bình Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số CB: 230001453/PCBA-HN
Sản xuất tại Việt Nam